

Aruande “Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimistega” vormi muutmisest ja selle täitmisest

Aruande vormis on toimunud alljärgnevad muudatused (tabelis märgitud punasega):

- **Tab. 3**

Vastavalt kehtivale immuniseerimiskavale immuniseeritakse Eesti lapsi difteeria-teetanuse vastu 6 korda (3 vaktsineerimist + 3 revaktsineerimist). III revaktsineerimine toimub 15 -16-aastaselt. Tabelist on eemaldatud 7. doos ehk IV revaktsineerimine.

Erandjuhtudel (ekslüüditult tehtud lisarevaktsineerimine; laps tuli välismaalt, kus teda revaktsineeriti difteeria-teetanuse vastu 4 korda jms) märgitakse aruandes viimane manustatud doos III revaktsineerimisena.

- **Tab. 4**

Tuberkuloosi vastu vaktsineeritud ja vaktsineerimata laste arvud arvutatakse kuni 6 aasta vanuseni (ka).

- **Tab. 5 – HPV (uus!)**

Koolitervishoiuteenuse osutaja täidab tabelis 5 roheline osa. Tabelisse sisestab koolitervishoiuteenuse osutaja seisuga 31.12.2018 arvel olevate tütarlaste arvud ja 1., 2. ning erandjuhtudel 3. doosiga vaktsineeritud tütarlaste arvud sünniaastate kaupa.

Märkus: kui koolitervishoiuteenuse osutajal on andmeid sihtrühma tütarlapse koolivälise (nt perearsti juures) HPV vaktsineerimise kohta, siis sisestab ta tabelisse ka need andmed. Koolitervishoiuteenuse osutaja ei ole kohustatud aktiivselt otsima andmeid kooliväliselt tehtud HPV vaktsineerimiste kohta.

Muud juhised aruande täitmiseks

Rotaviirus

- Lugeda laps vaktsineerituks juhul, kui talle on manustatud kolm Rota Teqi doosi;
- Lugeda laps pooleli vaktsineerituks juhul, kui talle on manustatud üks või kaks Rota Teqi doosi;
- Lugeda laps vaktsineerituks juhul, kui talle on manustatud kaks Rotarixi doosi;
- Lugeda laps pooleli vaktsineerituks juhul, kui talle on manustatud üks Rotarixi doos

Hib

Kui immuniseerimist Hib-vaktsiiniga alustatakse vanuses alates 12 kuud, siis piisab *H. influenzae tüüp b* infektsiooni suhtes haiguskindluse saavutamiseks Hib-vaktsiini ühest doosist. Sel juhul loetakse laps täielikult vaktsineerituks ja revaktsineerituks Hib vastu.

HepB

Kui last immuniseeriti B-virushepatiidi vastu kuuevalentse vaktsiiniga, siis tuleb lugeda last vaktsineerituks B-virushepatiidi vastu, kui ta on saanud DTPa-IPV-Hib-HepB vaktsiini 3 doosi.

- DTPa-IPV-Hib-HepB vaktsiini 4. doos on revaktsineerimine B-virushepatiidi vastu.
- Kui HBsAg-positiivsel emal sündinud last vaktsineeriti sünnijärgselt B-virushepatiidi monovaktsiini ühe või kahe doosiga, siis neid annuseid ei arvestata immuniseerimisskeemi osana.

- Kui last immuniseeriti B-virushepatiidi vastu monovaktsiiniga, siis tuleb lugeda last vaktsineerituks B-virushepatiidi vastu, kui ta on saanud HepB vaktsiini 3 doosi.